vehémenti malo nisi æqué vehemens auxilium,
Succurrere non potest.

cel. c. L ii. c ii. p 84.

observation
Sur une tumeur éxistante depuis
28 ans
par mr. Euesque étudiant en chirurgie
fils de maître, à nismes.

ACADÉMIE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le 10e juillet 1778. Le nommé jean Badouin
fabriquant de bas à nismes, âgé de 36 ans,
taille moyenne, d'un temperament bilieux-
-mélancholique, pere de quatre enfans bien constitués,
me fit appeller pour être Sécouru d'une douleur
Lancinante insupportable qu'il éprouvait à la joüe
droite parvénue à ce dégré depuis 18 mois; une
tumeur ovale d'un pouce et demi d'élévation, sans
changement de couleur à la peau, garnie de longs
cheveux et étendüe depuis l'apophise zigomatique
du même côté jusqu'à dix lignes au dessous

ARC43
n° 88

de l'angle de la machoire inferieure d'une part,
et depuis l'apophise mastoïde de l'autre étoit le Siege
de cette douleur. La base de la tumeur avoit 13 pouce de
circonference. La tumeur, d'une renitence présque osseuse
par sa base, présentait une fluctuation élastique vers
le centre, qui paraissait avoir plusieurs foyers. le principe
de sa formation et de son accroissement, imperceptible, douloureux
et periodique, est rapporté par le malade à l'âge de huit
ans. la mastication et l'ouïe étaient prés qu'abolies par
la compréssion de la tumeur sur les parties auxiliaires,
ou éxécutrices de leurs fonctions: une humeur lympide
transudait en forme de rosée par les pores de la peau
du temple droite toutes les fois que le d. Badouin
mangeait; la fievre et l'insomnie se joignirent à la douleur.
une saignée du Bras je ne me rappelle point à quelle doze,
lui procura un peu de soulagement. le lendemain, j'appellai
en consultation mr. Sabarot de la verniere medecin
agrégé du colege de cette ville. qui d'apré l'examen de cette
tumeur et des symtomes fâcheux que le malade
éprouvait, me sembla augurer mal de l'événement;

il conseilla l'application des cataplasmes calastiques
et parégoriques maturatifs et le passage d'un séton
à travers la tumeur dèsque les cataplasmes en auraient
formé l'ouverture, et interieurement les sedatifs, les
fondants. les purgatifs, employez selon l'étât de la tumeur
et les forces du malade. je me rappellai de son conseil, et
je me promis de le mettre en usage si le cas l'exigeait.
le lendemain le malade m'associa un autre chirurgien
qui mit envain sur le mal pendant un mois l'emplatre
de diachilum cum gummis Badouin fut reduit dans
le plus triste étât par l'excès de la douleur. le 10.e aoust
j'appliquai sur la partie affectée un cataplasme fait
avec la mauve l'oignon, l'onguent de la mere l'oignon
de lys et la fleur de soulphre, ce topique renouvellé dans
la journée deux fois par jour, produisit dans l'espace de
48 heures le ramolissement de la partie avec une petite
ouverture entre l'helix et l'anthelix par ou il sortit une
quantité d'humeurs épaisses, le 3.e jour de cette application
j'en dilatai l'ouverture d'un pouce, ce qui donna issûe
à une douzaine de vésicules qui furent percées avec
une lancette à mésure qu'elles se présentaint à l'ouverture.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

elles étaint du volûme d'un œuf de poule, en un mot,
les mêmes qui sont contenues dans la Bouteille cy jointe.
la prission de la tumeur faite le 14 du d. mois
en expulsa encore une huitaine et je passai un Seton,
que je portai depuis l'orille jusquá la partie moijene
posterieure du col au moyen d'une contre ouverture, le
17 j'associai un Second Seton au premier, qui traversa
la tumeur en forme de V romain par une petite
ouverture faite á son sommet. le fruit de cette opération
ne fut point sans orage. Sur les neuf heures du Soir
la fiévre saisit le malade, et le frisson durat une heure
et demi avec un Sentiment fort vif. la chaleur qui y
succéda jusqu'à trois heures du matin me fit craindre la
résorbstion de la matiere purûlente, le 18e l'odeur du pûs
dévénait tres fœtide. et la derniére vésicule sortie de
la tumeur me parût noirâtre, j'usai d'une décoction
du Kina. les jours suivants, la matiere prit une couleur
et une consistance laiteuse le 20e Badouin éprouva
une suffocation et une colique ménaçantes vers le neuf

heures du Soir, il fut purgé le lendemain et
la Suppûration me parut prendre un meilleur
caractere; il usa de Boüillons aperitifs, la décoction
d'aristoloche les Bols fondants lui furent administrez.
vers la fin. de la dépréssion de la tumeur, une
trainée de pierre à cautere fut appliquée sur
un reste de la tumeur Situé vers l'apophise mastoïde.
le Seton fut alors Supprimé et je terminai la
cure en faisant prendre au malade la décoction
de Salsepareille coupée avec le lait, jean
Badouin est radicalement guéri le 2.e 9bre 1776.
les os de la face du côté malade Sont Sans aucune
difformité, quoique naturellement un peu plus
Saillants que de l'autre, pour qui y fait attention,
la cicatrice est Longitudinale, de letendue de
Six lignes au haut de la partie laterale posterieure
du col, couverte dans un repli de la peau, et il n'éprouve
actuellement aucune incommodité. c'est à l'academie
à retirer de ce fait. qui paraitra peut etre

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

commun aux yeux des chirurgiens ordinaires,
les notions et les conséquences pratiques, utiles,
pour se conduire surément en pareil cas, et à
moi de prouver à l'academie tout le zéle et
l'émulation qui sont de ma petite sphere, &
qu'éxige la chirurgie et le bien de l'humanité.

Evesque